

Disinfezione

Rapidchlor 50

Cloro in pastiglie ad azione rapida, 20g



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e algicida per acqua di piscine private, per utenti privati e professionali. Pastiglie solubili rapidamente da 20 g per la disinfezione shock. Aumenta rapidamente il contenuto di cloro dell'acqua. Grazie al formato in pastiglia, la quantità necessaria può essere facilmente dosata senza dover pesarla. Così, le compresse sono particolarmente di facile utilizzo.



Dosaggio & Modo d'impiego

Quantità da utilizzare in caso di prima applicazione oppure circa ogni due settimane per una dosaggio: clorazione d'urto: 3 - 5 pastiglie / 10 m³. Clorazione continua: 1 pastiglia per 10 m³ circa ogni 3 giorni. Aggiungere fino ad avere minimo 0,5 mg / l cloro libero all'uscita della vasca. Mettere le pastiglie in un recipiente sciogli cloro o direttamente nello skimmer.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può aggravare un incendio; comburente. Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili. Indossare guanti/ Proteggere gli occhi. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso: Contatto con la pelle:** Lavare subito abbondantemente con acqua. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico. In caso di bruciature applicare acqua fredda fino a diminuzione del dolore, poi richiedere consultazione medica. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare immediatamente l'oculista. Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 5 minuti. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne 1-2dl. Se possibile trattenere il vomito. Non somministrare alcunchè a persone svenute. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico.

- **Ingrediente attivo** Simclosene, N. CAS 87-90-1, 55,5 g/100 g.
- **Contiene** Carbonato di sodio, N. CAS 497-19-8.
- **UN3077**
- **UFI** RC80-V0P3-U009-1H2H
- **CHZB0526**
- **Misure del contenitore disponibili** 1 | 3 | 5 kg
- **Pittogrammi**

